

浸水した家屋等を消毒される方へ

感染症発生予防のためには、**清掃と乾燥**が最も重要です！

消毒は、汚れがなく乾いた状態で行わないと、十分な効果が得られません

屋外（床下や庭）の消毒は原則不要です

消毒の手順

消毒を行う前に！

ゴム手袋やマスク、長靴を着用する

ドアや窓を開けて、**しっかりと換気**する

家具や床の**汚れをしっかりと清掃**する

きれいにした家具や床を**しっかりと乾燥**させる



主な消毒薬と使用方法

消毒対象	消毒薬	使用方法
家具類、床、壁	0.1% 塩化ベンザルコニウム (逆性石けん)	泥などの汚れをしっかりと拭き取ってから、十分に乾燥させた後、薄めた消毒薬を浸した布などでよく拭く。
手指	0.1% 塩化ベンザルコニウム (逆性石けん)	汚れを石けんで洗ったあと、水道水で石けんを洗い流し、洗面器などに薄めた消毒薬を入れ、手首まで浸し、30 秒以上もみ洗いする。その後、乾いたタオルなどでふき取る。
食器類、流し台、浴槽	0.02% 次亜塩素酸ナトリウム (家庭用塩素系漂白剤でも可)	水道水で汚れを洗い流した後、薄めた消毒薬に 5 分以上浸し、水ですすぎ、乾燥させる。 金属製の食器は腐食することがあるため、注意する。


使用方法を誤ると健康を害するおそれもあるため、薬液の濃度や用法などは、各製品の使用上の注意事項にしたがって使用してください。

消毒液の希釈方法

消毒薬は種類によって**希釈して（薄めて）** 使用するものがあります


消毒薬は**使用上の注意事項**を確認してから、使用しましょう

0.1%希釈の簡易的な方法



バケツ（10ℓ）を使用する場合


10%消毒薬を
100 倍に希釈する！



ペットボトル（1ℓ）を使用する場合

0.02%希釈の簡易的な方法

10%消毒薬を
500 倍に希釈する！



ペットボトル（2ℓ）を使用する場合

10%消毒薬
キャップ 1 杯（4～5cc）

清掃、消毒作業が終わったら、**しっかりと手洗い**をする

消毒薬が目に入った場合は、水で洗い流し、**医師の診察を受ける**